

Čo robiť v prípade vpichu včelou?

V prípade vpichu je potrebné miesto vpichu umyť vodou, priložiť ľadový obklad na zmiernenie zápalovej reakcie. Miesto po odstránení žihadla potrieť protialergickým gélom (napr. Fenistil gél) pri vážnejších alergických reakciách je potrebné užiť Antihistaminikum. Uprednostňuje sa rozhryzenie pred prehĺtnutím celej tablety, kvôli rýchlejšiemu účinku. Pri extrémne silnej reakcii je potrebné použiť adrenalinové pero.

Prvá pomoc pri anafylaktickom šoku

Hlavným cieľom prvej pomoci je zachovanie základných životných funkcií, a to dýchania a krvného obehu. Následne treba dodržať nasledovné kroky:

Okamžite privolať pomoc tel.č. 155

Postihnutého položiť do protišokovej polohy so zdvihnutými dolnými končatinami nad úroveň hlavy;

Ak má osoba pri sebe pohotovostný balíček, je nevyhnutné ako prvé podať adrenalín, najmä ak sú prítomné príznaky zlyhávania dýchacieho alebo obehového systému;

Pri dusení podať inhalačný prípravok na rozšírenie dýchacích ciest;

Následne podať 1-2 tablety antihistaminík;

Ak postihnutá osoba nereaguje na podnety, je potrebné začať s resuscitáciou – udržiavať životné funkcie postihnutého do príchodu zdravotnej pomoci.

Postup pri vzniku požiaru:

POŽIAR je potrebné okamžite uhasiť ručným hasiacim prístrojom, okamžite ohlásiť záchranným zložkám a starostovi obce Ing. Š. Kováčovi (0903 637 796).

Základné telefonické spojenia:



Záchranný centrálny systém : tel. č. 112, 155

Polícia: tel. č. 112 ,158

Hasičský záchranný zbor: tel. č. 112,150

